

## **Enteritis por parvovirus canino**

- Es una infección viral muy contagiosa que ataca el tracto gastrointestinal y los glóbulos blancos de la sangre de cachorros, perros y otros animales salvajes
  - Al virus hacer esto causa una destrucción de las defensas del paciente y estos desarrollan síntomas de enteritis severa, anorexia, vómitos, diarrea hemorrágica y estado de debilidad severo
- Este virus es altamente contagioso y se propaga por contacto directo de perro a perro o por contacto con las heces fecales de perros infectados, el ambiente o personas contaminadas
- El virus puede sobrevivir y propagarse a través de superficies como perreras, alimentos y tazones de agua o comida, collares, correas, y las manos y ropa de personas expuestas al virus
- El virus es resistente al calor, frío, humedad, y sequía lo cual le permite sobrevivir en el ambiente por largos periodos de tiempo
- Todos los perros corren riesgo de infección , pero los cachorros menores de 4 meses de edad y los perros que nunca has sido vacunados adecuadamente contra el parvovirus canino tienen el mayor riesgo de infección y enfermedad
- Los signos de la infección incluyen:
  - Letargo
  - Pérdida de apetito
  - Fiebre o baja temperatura
  - Dolor e hinchazón abdominal
  - Vómitos
  - Diarrea muy fuerte y a menudo con sangre
- Al tener vómitos y diarrea persistente los perros afectados pueden desarrollar deshidratación rápidamente y el daño a los intestinos y el sistema inmunológico puede causar un choque séptico
- La mayoría de los pacientes que fallecen a causa de la infección tienden a hacerlo en las primeras 48-72 horas después de la aparición de los signos clínicos
- Si su perro muestra algunos de estos signos, debería contactarnos inmediatamente

- Para determinar si su perro tiene la infección de parvovirus canino su veterinario le hará una prueba de heces fecales para confirmar el diagnóstico
- No existe un medicamento específico que mate el virus en perros infectados, y el tratamiento tiene la finalidad de ayudar a los sistemas del cuerpo del perro hasta que su sistema inmunológico pueda combatir la infección viral por sí mismo
- El tratamiento debe comenzar de inmediato, consistiendo principalmente en cuidados intensivos para combatir la deshidratación, controlar los vómitos y la diarrea y evitar infecciones secundarias
- Cuando un perro desarrolla parvo, dependiendo de la severidad, el tratamiento puede ser muy costoso y el perro puede morir a pesar de recibir un tratamiento agresivo
- Es vital la detección temprana y un tratamiento apropiado. Con un tratamiento apropiado, las tasas de sobrevivencia pueden alcanzar hasta un 90 %
- Al ser un virus tan contagioso es bien importante aislar a los perros infectados para minimizar la propagación de la enfermedad
- Es esencial la limpieza y desinfección adecuada de perreras contaminadas y otras zonas donde haya estado el perro infectado
- El virus no se elimina fácilmente así que contáctenos para recibir instrucciones específicas sobre limpieza y desinfectantes